

## **Карточка пациента, получающего иммунотерапию препаратом пролголимаб**

Детальную информацию о безопасности препарата пролголимаб можно найти в инструкции по медицинскому применению.

При возникновении вопросов просьба обращаться в компанию BIOCAD: 8 (800) 200-08-16, [safety@biocad.ru](mailto:safety@biocad.ru).

### **О препарате пролголимаб<sup>1</sup>**

Пролголимаб – анти-PD-1 моноклональное антитело. Препарат, относящийся к группе ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Особенностью этих препаратов является активация иммунной системы, которая может приводить к тяжелым иммуноопосредованным нежелательным явлениям (иоНЯ).

Контактная информация ПАЦИЕНТА	Контактная информация ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА	Контактная информация ЛИЦА ДЛ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ
ФИО _____	ФИО _____	ФИО _____
Тел. _____	Тел. _____	Тел. _____
Адрес _____	Адрес _____	Адрес _____

### **Важная информация для врачей<sup>2</sup>**

Во время или после терапии пролголимабом у пациента могут возникнуть иммуноопосредованные нежелательные явления (иоНЯ). Раннее выявление и коррекция иоНЯ позволит минимизировать последствия иоНЯ. При подозрении на иоНЯ требуется провести тщательную оценку с целью подтвердить этиологию и исключить другие возможные причины. Основываясь на тяжести нежелательной реакции, необходимо временно отменить терапию пролголимабом и назначить глюкокортикостероиды.

---

<sup>1</sup> Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ФОРТЕКА®. Регистрационное удостоверение ЛП-06173 от 16.04.20

<sup>2</sup> Проценко С. А., Антимоник Н. Ю., Берштейн Л. М., Новик А. В. и соавт. Практические рекомендации по коррекции иммуноопосредованных нежелательных явлений // Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO. 2017;3(s2):592–620.

## НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ СИМПТОМОВ ИММУНОПОСРЕДОВАННЫХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Легкое	Желудочно-кишечный тракт	Печень	Почки	Кожа	Эндокринные
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Затрудненное дыхание</li> <li>▶ Боль в груди</li> <li>▶ Кашель</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Диарея</li> <li>▶ Выраженная перистальтика</li> <li>▶ Примесь слизи, крови в стуле</li> <li>▶ Темный дегтеобразный вязкий стул</li> <li>▶ Боль в животе</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Тошнота или рвота</li> <li>▶ Снижение аппетита</li> <li>▶ Боль в правом подреберье</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уменьшение количества или изменения цвета мочи</li> <li>▶ Кровь в моче</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зуд, сыпь</li> <li>▶ Витилиго</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Слабость и утомляемость</li> <li>▶ Головокружение</li> <li>▶ Увеличение или потеря массы тела</li> <li>▶ Сухость во рту</li> <li>▶ Изменение тембра голоса</li> <li>▶ Нарушение зрения</li> <li>▶ Выпадение волос</li> </ul>

Незамедлительно обратитесь к вашему лечащему врачу, если у вас появятся симптомы или признаки, описанные в этой карточке или другие!

**ВНИМАНИЕ!** Возможно возникновение иоНЯ различного характера, в том числе не перечисленных в карточке пациента. При возникновении подозрений на иоНЯ обязательно обратитесь к лечащему врачу!